

**INDICAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI E/O PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SPECIFICI IN ORARIO SCOLASTICO/FORMATIVO**

**PREGRESSA ANAFILASSI ( da alimenti o veleno di imenotteri )**

**PIANO D'AZIONE PERSONALIZZATO**

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Classe \_\_\_\_\_ \SCUOLA \_\_\_\_\_

Allergia a : \_\_\_\_\_

**I SEGNI DI REAZIONE ALLERGICA INCLUDONO:**

1. Occhi: arrossamento e/o sfregamento degli occhi, lacrimazione
2. Naso: sternali ripetuti, prurito nasale, naso "che cola", sensazione acuta di naso tappato
3. Bocca: prurito e gonfiore delle labbra, lingua o bocca
4. Cute: senso di calore, prurito al cuoio capelluto, orticaria, eruzione pruriginosa e/o gonfiore della faccia o di mani / piedi e/o della zona perigenitale
5. Intestino: nausea, crampi addominali, vomito e/o diarrea
6. Respiro alterato :
  - A. lievi accessi di tosse e respiro lievemente accelerato
  - B. senso di chiusura e/o nodo alla gola e/o senso di soffocamento, raucedine acuta, importante difficoltà respiratoria, cianosi, arresto respiratorio
7. Circolo: pallore intenso, debolezza, sonnolenza, **PERDITA DI COSCIENZA**

**La severità dei sintomi può cambiare rapidamente evolvendo in situazioni pericolose per la vita!**

**COSA FARE:**

se l'assunzione\puntura è CERTA oppure è SOSPETTATA in base alla comparsa di uno o più tra i sintomi elencati **chiamare SUBITO il 112 (per sospetta ANAFILASSI)**

**SE COMPAIONO UNO O PIU' SINTOMI tra quelli elencati da 1 a 5 somministrare SUBITO**

() Formistin o Zirtec gtt \_\_\_\_\_ (1gtt\2kg)

() Kestine 10 mg lio

() Bentelan compresse da 1 mg \_\_\_\_\_ compressa/e per bocca (0,1-0,2 mg\Kg)

() altro \_\_\_\_\_

**QUALORA COMPARISSSE IL SINTOMO 6 A**

**somministrare oltre a cortisone e antistaminico Ventolin o Broncovaleas spray: 2 puff subito, ripetibili OGNI 20' FINO AD UN MASSIMO DI 3 VOLTE.**

- agitare la bomboletta
- uno spruzzo di Ventolin o Broncovaleas nel distanziatore
- far eseguire 5 respiri profondi attraverso il boccaglio o con la mascherina del distanziatore, solo con la bocca
- subito dopo i 5 respiri agitare la bomboletta e ripetere lo spruzzo di Ventolin o Broncovaleas
- far eseguire 5 respiri profondi attraverso il boccaglio o con la mascherina del distanziatore, solo con la bocca

**Dopo 20 Minuti, Se Necessario Ripetere Il Ciclo (1 spruzzo-5 respiri + 1 spruzzo-5 respiri )**

**Altra prescrizione:**

---

---

---

**QUALORA COMPARISSERO I SINTOMI 6 B e/o 7 somministrare adrenalina autoiniezzabile:**

- |  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> FAST JEKT 150 mcg | <input type="checkbox"/> JEXT 150 mcg | <input type="checkbox"/> CHENPEN 150 mcg |
| <input type="checkbox"/> FAST JEKT 300 mcg | <input type="checkbox"/> JEXT 300 mcg | <input type="checkbox"/> CHENPEN 300 mcg |

Avvisare la madre \_\_\_\_\_ il padre \_\_\_\_\_

**NON ESITARE NEL CONTATTARE IL 112 E NEL SOMMINISTRARE I FARMACI ANCHE SE I GENITORI NON POSSONO ESSERE RINTRACCIATI.**

data: \_\_\_\_\_

Timbro e Firma Medico del SSR che ha formulato il piano terapeutico e/o che ha prescritto la somministrazione del farmaco o l'intervento specifico.

\_\_\_\_\_